

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 febbraio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Executive Oro».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare l'art. 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 23 dicembre 2015 dall'impresa «Du Pont de Nemours italiana S.r.l.», con sede legale in Milano, via Pontaccio n. 10, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Executive Oro», contenete la sostanza attiva rimsulfuron, uguale al prodotto di riferimento denominato «Titus» registrato al n. 8130 con D.D. in data 30 dicembre 1992, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 15 dicembre 2015, dell'impresa medesima;



Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato ri-registrato in conformità all'allegato III del decreto legislativo n. 194/1995 e valutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI sulla base del dossier DPX E 9636;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento «Titus» registrato al n. 8130;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2006 di recepimento della direttiva 2006/39/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva rimsulfuron nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto regolamento e riportata nell'allegato al regolamento UE n. 540/2011;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 487/2014 della Commissione del 12 maggio 2014 che modifica il regolamento (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione di alcune sostanze attive tra cui il rimsulfuron, che risulta quindi approvato fino al 30 aprile 2018;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 aprile 2018, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 aprile 2018, l'impresa «Du Pont de Nemours italiana S.r.l.», con sede legale in Milano, via Pontaccio n. 10, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato EXECUTIVE ORO con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 50 - 100 - 110 - 150 - 200 - 300 - 500; sacchetti idrosolubili: g 50 (contiene cinque sacchetti da g 10) - 100 g (contiene due sacchetti da g 50) - 100 g (contiene cinque sacchetti da g 20).

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera: Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16565.

L'etichetta allegata al presente decreto, con la quale il prodotto fitosanitario deve essere posto in commercio, è corrispondente a quella proposta dall'impresa titolare per il prodotto di riferimento, adeguata per la classificazione alle condizioni previste dal regolamento 1272/2008, secondo quanto indicato nel comunicato del Ministero della salute del 14 gennaio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 16 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO



AVVERTENZE AGRONOMICHE

- Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare all'eribrida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, senza nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- E' importante che l'irrigazione di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare EXECUTIVE ORO. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'irrigatore prodotto impiegato.
- Subito dopo il trattamento con EXECUTIVE ORO e' importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
 - 1) Svuotare il serbatoio e risciacquare internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
 - 2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; aggiungere una soluzione detergente (0,5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
 - 3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
 - 4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
 - 5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:

- applicazioni su nuove varietà;
- applicazioni in sequenza con nuovi prodotti fitosanitari;
- Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soie.
- In caso di necessità, di risemina nei terreni già precedentemente trattati con EXECUTIVE ORO, ricominciare solo a metà, pomodoro e patata. Trascorsi 90 giorni dall'ultima applicazione di EXECUTIVE ORO non vi è limitazione alcuna per le colture in rotazione.

- Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione possono compromettere l'attività erbicida.

COMPATIBILITÀ: non e' raccomandata la miscelazione di EXECUTIVE ORO con altri prodotti fitosanitari non indicati in etichetta.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consiglia l'impiego di EXECUTIVE ORO su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop com e linee pure di mais per la produzione di sème. Non applicare su colture di patate destinate alla produzione di tuberi da sème.

Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta del pomodoro e della patata ed 80 giorni prima della raccolta del mais.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto e' responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - LAVARE TUTTO L'EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE DOPO L'IMPIEGO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

11 FEB. 2016

CARATTERISTICHE D'AZIONE

EXECUTIVE ORO e' un erbicida solfonilureico che blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione. EXECUTIVE ORO erodica ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiché EXECUTIVE ORO non ha attività residuale, l'effetto erodico si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.

Infestanti graminacee sensibili: *Avena* spp. (Avena selvatica), *Digitaria* spp. (Sanguinella), *Echinochloa* spp. (Giovane), *Panicum dichotomiflorum* (Panicco delle risaie), *Panicum miliaceum* (Panicco coltivato), *Phalaris* spp. (Scagliola), *Setaria* spp. (Paniccastrilla), *Sorghum bicolor* e *Sorghum halepense* da seme e da rizoma (Sorghetto).

Infestanti a foglia larga sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Amaranthus* spp. (Amaranto), *Ambrosia* spp. (Ambrosia), *Armi majus* (Visnaga maggiore), *Bidens bipinnata* (Forbice), *Capsella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Caysetia sepium* (Vilucchio bianco), *Digitaria* spp. (Rucola violacea), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinisoga parviflora* (Galinisoga), *Hellanthus luterus* (Topinanub), *Maircaia chamomilla* (Camomilla comune), *Mentha arvensis* (Menta campestre), *Orobancha* spp., *Picris scabrides* (Asraggine comune), *Ranunculus* spp. (Ranuncolo), *Repistrum rugosum* (Miegro peloso), *Siraps arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus* spp. (Crespino) e *Xanthium* spp. (Nappola).

EPOCA DI IMPIEGO: post-emergenza della coltura e delle infestanti.

DOSE D'IMPIEGO:

Maïs: 50 - 60 g/ha addizionato con bagnante Trend 90 allo 0,1% su colture allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore e' consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo; la dose maggiore e' consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali già sviluppate e Digitaria. Nei terreni torbosi o contro infestanti a nascita scalare (Abutilon theophrasti, Ciperacee, Digitaria spp., ecc.) e in genere contro infestanti perenni può essere utile un trattamento con 40-50 g/ha seguito, circa due settimane dopo, da un secondo intervento con 30 g/ha. Eventuali sarcolature alla coltura trattata devono essere effettuate in presenza di infestanti perenni non prima di 8-10 giorni dal trattamento. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Datura stramonium (Stramonio comune), Polygonum spp. (Correggiola) e Solanum nigrum (Erba megalia) è consigliato il trattamento con un prodotto ad attività specifica.

Pomodoro: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend 90 allo 0,1%, a partire dallo stadio coltellare su coltura seminata e dopo il superamento della crisi di trapianto su coltura trapiantata. In presenza di Solanum nigrum applicare 60 g/ha di EXECUTIVE ORO + Trend 90 allo 0,1%, entro 9 non oltre 10 stadio coltellare dell'infestante, ripetendo il trattamento dopo 7-10 giorni. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Polygonum spp. (Correggiola) e Portulaca oleracea (erba portulacina) è opportuna la miscela con Mesosin 35WG alla dose di 200-500 g/ha. Tale miscela può essere applicata, alle dosi più basse di Mesosin 35WG, a partire dalle due foglie vere della coltura. Con infestazione predominante di Echinochloa spp. (Giovane) applicare 50-60 g/ha di EXECUTIVE ORO + bagnante Trend 90 allo 0,1%, effettuando, in caso di infestazioni successive, un secondo trattamento con 30 g/ha di EXECUTIVE ORO + Trend 90 allo 0,1% a distanza di 7-10 giorni.

In presenza di *Orobancha* spp. prevedere da 2 a 3 interventi tramite distribuzione in manichetta a dosi variabili tra 30 e 50 g/ha per un totale massimo di 110 g/ha. Sia su coltura seminata che su coltura trapiantata, la prima applicazione dovrà avvenire all'apertura del primo palco florale. Le applicazioni successive dovranno essere effettuate ad un intervallo di 10-15 giorni dalla prima in funzione dell'andamento climatico, riservando l'intervallo più breve su cicli colturali tardivi.

Patata: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend 90 allo 0,1%, quando la coltura ha un'altezza media di 10-20 cm. In caso di infestazioni successive il trattamento può essere ripetuto utilizzando 30 g/ha di EXECUTIVE ORO + Trend 90 allo 0,1%.

VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha.

Utilizzare ugelli a ventaglio e medie-basse pressioni di esercizio.

PREPARAZIONE DELLA FOLGLIA

EXECUTIVE ORO, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irrigatore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante Trend 90 nella quantità necessaria dopo aver inserito EXECUTIVE ORO.

EXECUTIVE® ORO

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per maïs, patata e pomodoro.

Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile



ATTENZIONE

EXECUTIVE ORO®
 100 grammi di prodotto contengono:
 Rimsulfuron p.a. puro g 25
 Coformulanti q. b. a 100
 Contiene fosfato disodico

INDICAZIONI DI PERICOLO
 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)

CONSIGLI DI PRUDENZA
 Non disperdere nell'ambiente (P273)
 Raccolgere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/contenitore in conformità con la normativa vigente (P501).

Titolare della Registrazione:
 Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
 telefono 800378337

Officine di Produzione:
 Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia
 del Ministero della Salute

Registrazione n.: g 50 (contiene 1 sacchetto da g 50) PARTITA N.
Altre taglie autorizzate: g 50 (contiene 5 sacchetti da g 10) - g 100 (contiene 2 sacchetti da g 50) - g 100 (contiene 5 sacchetti da g 20)


PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

- Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali per maïs e patata (nel caso di siringa applicazione) e per pomodoro (nel caso di doppia applicazione)
- Per proteggere le piante terrestri rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona non coltivata.
- Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.
- Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
- Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

NORME PRECAUZIONALI: Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrarli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
 Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118



EXECUTIVE® ORO

Erbicida selettivo per post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro - Granuli idrosolubili

EXECUTIVE ORO® COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron p.a. puro g 25
Cofomulanti g. b. a 100
Contiene fosfato disodico

INDICAZIONI DI PERICOLO

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)

CONSIGLI DI PRUDENZA

Non disperdere nell'ambiente (P273).
Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/contenitore in conformità con la normativa vigente (P501).

Titolare della Registrazione:

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
telefono 800378337

Officine di Produzione:

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione n. del

del Ministero della Salute

Contenuto netto: g 50

Partita n.

Altre taglie autorizzate: g 100 - 110 - 150 - 200 - 500

ATTENZIONE

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali per mais e patata (nel caso di singola applicazione) e per pomodoro (nel caso di doppia applicazione)
-Per proteggere le piante terrestri rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona non coltivata.
-Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.
-Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Evitare la contaminazione d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrarli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE D'AZIONE

EXECUTIVE ORO è un ericida selettivo che blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione. EXECUTIVE ORO, ericida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiché EXECUTIVE ORO non ha attività residuale, l'effetto ericida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.

Infestanti graminacee sensibili: *Avena spp.* (Avena selvatica), *Digitaria spp.* (Sanguinella), *Echinochloa spp.* (Gialone), *Panicum dichotomiflorum* (Panicò delle risaie), *Panicum mitisacum* (Panicò coltivato), *Phalaris spp.* (Scaciola), *Setaria spp.* (Panicastrella), *Sorghum bicolor* e *Sorghum halepense* da seme e da rizzoma (Scoriglietta).
Infestanti a foglia larga sensibili: *Abutilon theophrasti* (Cencio molle), *Amaranthus spp.* (Amaranto), *Ambrosia spp.* (Ambrosia), *Ammi majus* (Vishnaga maggiore), *Bidens bipinnata* (Forbice), *Capisella bursa-pastoris* (Borsa del pastore), *Convolvulus arvensis* (Vilucchio), *Callistegia sepium* (Vilucchio bianco), *Dipsacis spp.* (Rucola violacea), *Fumaria officinalis* (Fumaria), *Galinsoga parviflora* (Galinsoga), *Helianthus tuberosus* (Topinambur), *Malticaria chamomilla* (Cammilla comune), *Mentha arvensis* (Menta campestre), *Orobancha spp.*, *Picris echinoides* (Asparginne comune), *Ranunculus spp.* (Ranuncolo), *Ranistrum rugosum* (Mladgo peccoso), *Senecio arvensis* (Senape selvatica), *Sonchus spp.* (Crespino) e *Xanthium spp.* (Nappola).

EPOCA DI IMPIEGO: post-emergenza della collura e delle infestanti.

DOSE D'IMPIEGO:

Mais: 50 - 60 g/ha addizionato con bagnante Trend 90 allo 0,1% su colture allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore è consigliata su infestanti graminacee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo; la dose maggiore è consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali già sviluppate e Digitaria. Nel terreno torboso o contro infestanti a nascita scolare (Abutilon theophrasti, Ciperacee, Digitaria spp., ecc.) e in genere contro infestanti perenni può essere utile un trattamento con 40-50 g/ha seguito, circa due settimane dopo, da un secondo intervento con 30 g/ha. Eventuali sarchiature alla coltura trattata devono essere effettuate in presenza di infestanti perenni non prima di 8-10 giorni dal trattamento. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Datura stramonium (Stramonio comune), Polygonum spp. (Correggiola) e Solanum nigrum (Erba mezza) è consigliato il trattamento con un prodotto ad attività specifica.

Pomodoro: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend 90 allo 0,1% a partire dallo stadio coltorente su coltura seminata e dopo il superamento della crisi di trapianto su coltura trapiantata. In presenza di Solanum nigrum applicare 50 g/ha di EXECUTIVE ORO + Trend 90 allo 0,1%, entro e non oltre lo stadio coltorente dell'infestante, ripetendo il trattamento dopo 7-10 giorni. In presenza di Chenopodium spp. (Farinello), Polygonum spp. (Correggiola) e Portulaca oleracea (erba porcellana) è opportuna la miscela con Mesozin 35WG alla dose di 200-500 g/ha. Tale miscela può essere applicata, alle dosi più basse di Mesozin 35WG, a partire dalle due foglie vere della coltura. Con infestazione predominante di Echinochloa spp. (Gialone) applicare 50-60 g/ha di EXECUTIVE ORO + bagnante Trend 90 allo 0,1%, effettuando, in caso di infestazioni successive, un secondo trattamento con 30 g/ha di EXECUTIVE ORO + Trend 90 allo 0,1% a distanza di 7-10 giorni.

In presenza di *Orobancha spp.* prevedere da 2 a 3 interventi tramite distribuzione in manichetta a dosi variabili tra 30 e 50 g/ha per un totale massimo di 110 g/ha. Sia su coltura seminata che su coltura trapiantata, la prima applicazione dovrà avvenire all'apertura del primo palco floreale. Le applicazioni successive dovranno essere effettuate ad un intervallo di 10-15 giorni dalla prima in funzione dell'andamento climatico riservando l'intervallo più breve su cicli colturali tardivi. **Patata:** 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend 90 allo 0,1% quando la coltura ha un'altezza media di 10-20 cm. In caso di infestazioni successive il trattamento può essere ripetuto utilizzando 30 g/ha di EXECUTIVE ORO + Trend 90 allo 0,1%.

VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha.

Utilizzare ugelli a ventaglio e medie-basse pressioni di esercizio.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

EXECUTIVE ORO, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante Trend 90 nella quantità necessaria dopo aver inserito EXECUTIVE ORO.

AVVERTENZE AGRONOMICHE

- Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.

- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.

- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.

- È importante che l'attrezzatura di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare EXECUTIVE ORO. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.

- Subito dopo il trattamento con EXECUTIVE ORO è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquare internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.

2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0,5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.

3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.

4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.

5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:

- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in sequenza con nuovi prodotti fitosanitari.
- Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.

- In caso di necessità di rimesima nei terreni già precedentemente trattati con EXECUTIVE ORO, ricomporre a mais, pomodoro e patata. Trascorsi 90 giorni dall'ultima applicazione di EXECUTIVE ORO non vi è limitazione alcuna per le colture in rotazione.

- Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione possono compromettere l'attività erbicida.

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di EXECUTIVE ORO con altri prodotti fitosanitari non indicati in etichetta.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di infestazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta. Si consiglia l'impiego di EXECUTIVE ORO su mais dolce, mais bianco, mais vitreo, mais da pop corn e linee pure di mais per la produzione di seme. Non applicare su colture di patate destinate alla produzione di tuberi da "seme".

INTERVALLO DI SICUREZZA
Sospendere i trattamenti 30 giorni prima della raccolta del pomodoro e della patata ed 80 giorni prima della raccolta del mais.

ATTENZIONE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - LAVARE TUTTO L'EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE DOPO L'IMPIEGO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

®Marchio registrato E. I. DuPont de Nemours & Co., Inc

Etichetta autorizzata con segreto difendibile del.....

11.6 FEB. 2016

ETICHETTA PER SACCHETTO IDROSOLUBILE

EXECUTIVE[®] ORO

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro -
Granuli idrodispersibili in sacchetto idrosolubile

EXECUTIVE ORO[®]
COMPOSIZIONE
 100 grammi di prodotto contengono:
 Rimsulfuron p.a. puro g 25
 Coformulanti q. b. a 100
 Contiene fosfato disodico

INDICAZIONI DI PERICOLO
 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)

CONSIGLI DI PRUDENZA
 Non disperdere nell'ambiente (P273). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/contenitore in conformità con la normativa vigente (P501).

Titolare della Registrazione:
 Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
 telefono 800378337

Officina di Produzione:
 Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione n. del del Ministero della Salute

Contenuto netto del sacchetto: g 10
Altre taglie autorizzate: g 20 - g 50

AVVERTENZA:
Leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione







NON TOCCARE CON MANI O GUANTI BAGNATI
DA SCIOLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE




ATTENZIONE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....16 FEB. 2016

MODO DI UTILIZZO DEL SACCHETTO IDROSOLUBILE

					
1	2	3	4	5	6
Riempire il serbatoio di circa 1/4 di acqua	Assicurarsi di avere le mani asciutte	Estrarre il sacchetto idrosolubile dall'involucro protettivo	Gettare il sacchetto idrosolubile nella botte	Mettere in funzione l'agitatore ed attendere lo scioglimento del sacchetto (5 min)	Portare la botte a volume

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI: Il rispetto delle indicazioni sopranportate fa' sì che il contenitore del sacchetto idrosolubile non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato; pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.



ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

EXECUTIVE® ORO

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro
Granuli idrodispersibili

EXECUTIVE ORO®**COMPOSIZIONE**

100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron puro g 25
Coformulanti q. b. a 100
Contiene fosfato disodico.

INDICAZIONI DI PERICOLO

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)

CONSIGLI DI PRUDENZA

Non disperdere nell'ambiente (P273). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/contenitore in conformità con la normativa vigente (P501).

Titolare della Registrazione:

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
Telefono: 800378337

Officine di Produzione:

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione n. del del Ministero della Salute

Contenuto netto: g 50

PARTITA N.

Altra taglia autorizzata: g 100



ATTENZIONE

NORME PRECAUZIONALI:

Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. **Terapia:** sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

16 FEB. 2016


Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....



FOLGIO ILLUSTRATIVO

EXECUTIVE® ORO

Erbicida solifonilureico di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro – Granuli idrodispersibili



COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Rinfollatori p.a. puro g. 25
Coformulanti g. b. a 100
Contiene fostato disodico

INDICAZIONI DI PERICOLO
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)

CONSIGLI DI PRUDENZA
Non disperdere nell'ambiente (P273).
Raccogliere il materiale fuoriscio (P391).
Non contaminare in conformità con la normativa vigente (P501).

ATTENZIONE

Titolare della Registrazione:
Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10
telefono 800378337

Officine di Produzione:
Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione n. del del Ministero della Salute
Contenuto netto: g. 50
Altre taglie autorizzate: g. 100

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
-Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 10 metri dai corpi idrici superficiali per mais e patata (nel caso di singola applicazione) e per pomodoro (nel caso di doppia applicazione)
-Per proteggere le piante terrestri rispettare una fascia di sicurezza non trattata di 5 metri da zona non coltivata.

-Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.
-Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade).

NORME PRECAUZIONALI: Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

CARATTERISTICHE D'AZIONE
EXECUTIVE ORO è un erbicida solifonilureico che blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che si manifestano nel giro di 5 - 10 giorni dall'applicazione. EXECUTIVE ORO, erbicida ad assorbimento fogliare, deve essere applicato su infestanti giovani ed in attiva crescita. Poiché EXECUTIVE ORO non ha attività residuale, l'effetto erbicida si manifesta solo sulle infestanti presenti al momento del trattamento.

Infestanti graminee sensibili: Avena spp. (Avena sativa), Digitaria spp. (Sanguinella), Echinochloa spp. (Glavone), Panicum dichotomiflorum (Panicco delle risate), Panicum mitracium (Panicco coltivato), Phalaris spp. (Scagolajo), Setaria spp. (Paniccastrillo), Sorghum bicolor e Sorghum halepense da seme e da rizoma (Sorghetta).

Infestanti a foglia larga sensibili: Abutilon theophrasti (Cencio molle), Amaranthus spp. (Amaranto), Ambrosia spp. (Ambrosia), Ammi majus (Visnaga maggiore), Bidens bipinnata (Forbiche), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Convolvulus arvensis (Vilucchio), Calystegia sepium (Vilucchio bianco), Diplotaxis spp. (Rucola violacea), Fumaria officinalis (Fumarica), Galinsoga parviflora (Galinsoga), Helianthus tuberosus (Topinambur), Matricaria chamomilla (Camomilla comune), Mentha arvensis (Menta campestre), Orbanche spp., Picris echinoides (Aspagnone comune), Ranunculus spp. (Ranuncolo), Rapistrum rugosum (Miegro paloso), Straps arvensis (Senape selvatica), Sonchus spp. (Crespino) e Xanthium spp. (Neppolajo).

EPOCA DI IMPIEGO: post-emergenza della coltura e delle infestanti.

DOSE D'IMPIEGO:
Mais: 50 - 60 g/ha addizionato con bagnante Trend 90 allo 0,1% su colture allo stadio compreso tra 2 e 8 foglie. La dose minore è consigliata su infestanti graminee e dicotiledoni annuali ai primi stadi di sviluppo; la dose maggiore è consigliata su infestanti perenni, malerbe annuali già sviluppate e Digitaria. Nel terreno torboso o contro infestanti a nascita scature (Abutilon theophrasti, Ciperacee, Digitaria spp., ecc.) e in genere contro infestanti perenni può essere utile un trattamento con 40-50 g/ha seguito, circa due settimane dopo, da un secondo intervento con 30 g/ha. Eventuali sarciature alla coltura trattata devono essere effettuate in presenza di infestanti perenni non prima di 8-10 giorni dal trattamento. In presenza di Chenopodium spp. (Fainello), Datura stramonium (Stramonio comune), Polygonum spp. (Correggiola) e Solanum nigrum (Erba morella) è consigliato il trattamento con un prodotto ad attività specifica.

Pomodoro: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend 90 allo 0,1%, a partire dallo stadio cotifloreare su coltura seminata e dopo il superamento della crisi di trapianto su coltura trapiantata. In presenza di Solanum nigrum applicare 50 g/ha di EXECUTIVE ORO + Trend 90 allo 0,1%, entro e non oltre lo stadio cotifloreare dell'infestante ripetendo il trattamento dopo 7-10 giorni. In presenza di Chenopodium spp. (Fainello), Polygonum spp. (Correggiola) e Portulaca oleracea (erba portellana) è opportuna la miscela con Mesozin 35VG alla dose di 200-500 g/ha. Tale miscela può essere applicata, alle dosi più basse di Mesozin 35VG, a partire dalle due foglie vere della coltura. Con infestazione predominante di Echinochloa spp. (Glavone) applicare 50-60 g/ha di EXECUTIVE ORO + bagnante Trend 90 allo 0,1%, effettuando, in caso di reinfestazioni successive, un secondo trattamento con 30 g/ha di EXECUTIVE ORO + Trend 90 allo 0,1% a distanza di 7-10 giorni.

La manichetta a dosi variabili tra 30 e 50 g/ha per un totale massimo di 110 g/ha. Sia su coltura seminata che su coltura trapiantata, la prima applicazione dovrà avvenire all'apertura del primo palco florale. Le applicazioni successive dovranno essere effettuate ad un intervallo di 10-15 giorni, dalla prima in funzione dell'andamento climatico, riservando l'intervento più breve su cicli colturali tardivi.

Patata: 50-60 g/ha con aggiunta di bagnante Trend 90 allo 0,1%, quando la coltura ha un'altezza media di 10-20 cm. In caso di reinfestazioni successive il trattamento può essere ripetuto utilizzando 30 g/ha di EXECUTIVE ORO + Trend 90 allo 0,1%.

VOLUME DI IRRORAZIONE: 200-400 litri/ha.
Utilizzare ugelli a ventaglio e medie-basse pressioni di esercizio.
PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
EXECUTIVE ORO alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatoio dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo in funzione l'agitatore. La miscela deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo. Aggiungere il bagnante Trend 90 nella quantità necessaria dopo aver inserito EXECUTIVE ORO.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
- Il prodotto contiene un p.a. inibitore dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di malerbe resistenti, si consiglia di alternare all'erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione.
- Effettuare i trattamenti con temperature comprese tra 13 e 25 °C.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- È importante che l'irrigazione di distribuzione sia perfettamente pulita prima di usare EXECUTIVE ORO. Si consiglia pertanto un lavaggio osservando le procedure indicate nell'etichetta dell'ultimo prodotto impiegato.
- Subito dopo il trattamento con EXECUTIVE ORO è importante lavare perfettamente l'attrezzatura di distribuzione operando come segue:
1) Svuotare il serbatoio e risciacquarlo internamente; lavare serbatoio e barra con acqua pulita per almeno 5 minuti e svuotare nuovamente.
2) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare una soluzione detergente (0,5 litri di ammoniaca per uso domestico al 6% ogni 100 litri d'acqua). Far circolare la soluzione attraverso pompa, barra e ugelli per almeno 15 minuti mantenendo l'agitatore in funzione; svuotare ancora.
3) Ripetere le istruzioni indicate al punto 2.
4) Risciacquare completamente il serbatoio con acqua pulita per almeno 5 minuti facendola circolare attraverso pompa e barra.
5) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente in un secchio contenente soluzione detergente (alla stessa concentrazione indicata al punto 2). Risciacquare con acqua pulita.

Si consiglia di effettuare saggi preliminari nei seguenti casi:
- applicazioni su nuove varietà
- applicazioni in sequenza con nuovi prodotti fitosanitari.
- Durante l'applicazione mantenere sempre in funzione l'agitatore della botte, anche durante eventuali soste.
- In caso di necessità di risemina nei terreni già precedentemente trattati con EXECUTIVE ORO, ricorrere solo a mais, pomodoro e patata. Trascorsi 90 giorni dall'ultima applicazione di EXECUTIVE ORO non vi è limitazione alcuna per le colture in rotazione.
- Eventuali precipitazioni che si verificassero entro 3 ore dall'applicazione possono compromettere l'attività erbicida.
COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di EXECUTIVE ORO con altri prodotti fitosanitari non indicati in etichetta.
AVVERTENZE: Da impiegare esclusivamente in agricoltura per gli usi ed alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI – PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - LAVARE TUTTO L'EQUIPAGGIAMENTO DI PROTEZIONE DOPO L'IMPIEGO - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

®Marchio registrato E.I. DuPont de Nemours & Co., Inc
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....

26 FEB. 2016

ETICHETTA IN FORMATO RIDOTTO

EXECUTIVE® ORO

Erbicida solfonilureico di post-emergenza selettivo per mais, patata e pomodoro
Granuli idrodispersibili

EXECUTIVE ORO®**COMPOSIZIONE**

100 grammi di prodotto contengono:
Rimsulfuron puro g 25
Coformulanti q. b. a 100
Contiene fosfato disodico.

INDICAZIONI DI PERICOLO

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H410). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401)

CONSIGLI DI PRUDENZA

Non disperdere nell'ambiente (P273). Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391). Smaltire il prodotto/contenitore in conformità con la normativa vigente (P501).

Titolare della Registrazione:

Du Pont de Nemours Italiana S.r.l. - Milano, Via Pontaccio 10

Telefono: 800378337

Officine di Produzione:

Du Pont de Nemours (France) S.A.S. - Cernay, Francia

Registrazione n. del del Ministero della Salute

Contenuto netto: g 50

PARTITA N.

Altra taglia autorizzata: g 100



ATTENZIONE

NORME PRECAUZIONALI:


Conservare il recipiente ben chiuso. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. In caso di incidente o di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:

Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Terapia: sintomatica.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI O CHIAMARE IL 118

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.....1.6 FEB. 2016



DECRETO 16 febbraio 2016.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Deltacom».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la domanda presentata in data 24 novembre 2015 dall'impresa Isagro SpA, con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato DELTACOM, contenete la sostanza attiva deltametrina, uguale al prodotto di riferimento denominato Antal registrato al n. 15536, ai sensi dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1107/2009, con D.D. in data 20 gennaio 2014, dell'Impresa medesima;



Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che:

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Antal registrato al n. 15536;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 con il quale la sostanza attiva deltametrina è stata considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 alle medesime condizioni di cui allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Ritenuto di assegnare al prodotto in questione validità fino al 30 ottobre 2016, data di scadenza attribuita al prodotto di riferimento ai sensi dell'art. 29 del Reg. (CE) n. 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 28 settembre 2012 concernente «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio.

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 ottobre 2016, l'impresa Isagro SpA, con sede legale in Milano, via Caldera n. 21, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato «Deltacom» con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 250 - 500; L - 1 - 5 - 10.

Il prodotto è preparato presso gli stabilimenti delle imprese:

Isagro SpA - Aprilia (Latina), via Nettunense km 23,400;

Isagro SpA - Adria Cavanella Po (Rovigo).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 16573.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai Prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

Roma, 16 febbraio 2016

Il direttore generale: RUOCCO



INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: Boccola la trasmissione nervosa ipersensibilizzata pre-potenziale; la trasmissione nervosa è...

CARATTERISTICHE: Un insetticida ad ampio spettro che agisce per contatto e ingestione. Dotato di una rapida azione abbattente, consente una protezione dei vegetali sufficientemente...

MODALITÀ D'IMPiego: (Suggerimenti: arancio, limone, mandarino, pompelmo, arancio amaro): Afidi (Myzus persicae): 30-50 ml/100 l (0,3-0,5 l/litro) in 1000 l/ha di acqua. Cocciniglia mezza grano di pepe...

Per il campo: (Suggerimenti: arancio, limone, mandarino, pompelmo, arancio amaro): Afidi (Myzus persicae): 30-50 ml/100 l (0,3-0,5 l/litro) in 1000 l/ha di acqua. Cocciniglia mezza grano di pepe...

Per il campo: (Suggerimenti: arancio, limone, mandarino, pompelmo, arancio amaro): Afidi (Myzus persicae): 30-50 ml/100 l (0,3-0,5 l/litro) in 1000 l/ha di acqua. Cocciniglia mezza grano di pepe...

INSETTICIDA PIRETROIDE A LARGO SPETTRO D'AZIONE PER IL CONTROLLO DEI PARASSITI DELLE COLTIVE ARBOREE ED ERBACEE

PERICOLO
100 g di prodotto contengono:
- Deltametrina pura 2,8 g (-25 g/l)
- Coformulanti q.b.a 9,100 g
SOLFONATO DI CALCIO LINEARE
INDICAZIONI DI PERICOLO
H226: liquido e vapori infiammabili; H302: nocivo se ingerito; H304: può essere letale in caso di ingestione e penetrazione nelle vie respiratorie.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non utilizzare il prodotto o il suo contenuto non pulito (l'applicazione in prossimità delle acque di superficie esterne la contaminazione attraverso i sistemi di scarico delle acque delle aziende agricole e delle serre. Pericoloso per le api. Al fine di proteggere le api e altri insetti impollinatori, non utilizzare il prodotto durante la fioritura o durante la fioritura di piante infestanti. Tenere lontano e/o disinquinare e erbacee prima del periodo di fioritura. Non utilizzare il prodotto durante il periodo di impollinazione della spiga. Dopo l'applicazione, le api devono rimanere nel loro alveare per almeno 1 giorno, con sufficiente cibo e acqua o andare via, ma non meno di 3 km di distanza. Non rientrare nei campi trattati prima che il trattamento sia completamente asciutto. Nel caso in cui un lavoratore entri nel campo poco dopo l'irrorazione, devono essere indossati indumenti protettivi e guanti adatti.

PROTEZIONE DEGLI ORGANISMI ACQUATICI: Per le acque di superficie: non trattare una fascia di sicurezza (una fascia di sicurezza) con acque superficiali di - 5 metri per colture erbacee foraggi (omnimeriti) - 2,5 metri per agrumi o 20 metri con ugli anti-diverba (riduzione 30%) - 30 metri per olivo o 25 metri con ugli anti-diverba (riduzione 30%) - 30 metri e uso obbligatorio di ugli anti-diverba (riduzione 30%) per pomacee, drupacee e frutta a guscio in applicazioni precoci - 25 metri e uso obbligatorio di ugli anti-diverba (riduzione 30%) per pomacee, drupacee e frutta a guscio in applicazioni tardive - 20 metri per vite in trattamenti precoci - 15 metri con ugli anti-diverba (riduzione 30%) - Su vite le applicazioni alla dose massima (200 ml/ha) dopo lo stadio di BBCH 20 vanno effettuate obbligatoriamente con ugli anti-diverba (riduzione 30%) e rivolgendosi il getto verso l'interno del campo quando si tratta l'ultima fila della coltura. - Sulle ornamentali le applicazioni vanno effettuate obbligatoriamente con ugli anti-diverba (riduzione 30%) e rivolgendosi il getto verso l'interno del campo quando si tratta l'ultima fila della coltura.

PREPARAZIONE E DISTRIBUZIONE
 Diluire la dose indicata di DELTACOM in poca acqua, versare nel secchiello e portare a volume, mantenendo in agitazione. Le dosi riportate si riferiscono a trattamenti a volume normale. Per trattamenti a volume ridotto, aumentare la concentrazione in proporzione alla riduzione del volume di acqua, così da mantenere la stessa dose di prodotto per ettaro indicata. DELTACOM agisce per contatto e ingestione. Occorre pertanto eseguire un trattamento molto accurato facendo in modo che la bagnatura sia il più uniforme possibile su tutta la vegetazione. In caso di vegetali la dritta bagnatura si consiglia l'aggiunta di un bagnante. Per assicurare la migliore efficacia del trattamento intervenire precocemente con DELTACOM. In caso di trattamenti ripetuti, il prodotto deve essere applicato in modo di copertura più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti p.i.t. bosca. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione comparsa.

Sospensionare i trattamenti 30 giorni prima del raccolto su agrumi, frutta a guscio, mais, frumento, orzo, segale, avena, barbababola, cotone, 14 giorni su erba medica, 7 giorni su pisello, 7 giorni su grano duro, grano tenero, pisello, fagiolo, lenticchia, cava, rava, aglio, cipolla, porro, tabacco, 3 giorni prima del raccolto su fragola, pomodoro, peperone, papavero, melanzana, cetriolo, carofano, zuccalino, melone, coccomero, fagiolo, spinacio, carciofo, prezzemolo, sedano, rucola, indivia.

Distribuito da: SCAM S.P.A. Strada Bellaria, 164 - 41126 Modena - Tel. 059-566511

ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DAMNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA E CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DAMNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con D.D. del

16 FEB. 2016

